

Ablauf der Organspende



Fragen:
frühzeitige Kontaktaufnahme mit dem TX-Zentrum, Tel. 0316/385-84444,
bzw. mit dem Transplantationsreferenten Süd,
Priv.- Doz. Prim. Dr. Michael Zink, Tel. 0676/375 83 25

Ablauf der Organspende

Erkennung und Vorklärung

Jeder Patient mit Verdacht auf Hirntod¹ – im Zweifelsfall immer melden!

- » ohne Altersbegrenzung (0–90 Jahre)
- » ohne Ursacheneinschränkung²

Verdacht auf Hirntod, wenn

- » tief komatöser Patient, der auf Absaugmanöver nicht reagiert
- » keine Pupillenreaktion auf Licht, kein Cornealreflex
- » keine Trigemini-Schmerzreaktion
- » „Puppenkopffänomen“ (bei Drehung des Kopfes: Augen bleiben starr/geradeaus)
- » Ausfall der Spontanatmung

Meldung eines potenziellen Spenders

Übermittlung der Basisdaten an das TX Zentrum

- » Name, Geburtsdatum, Blutgruppe, Größe, Gewicht, Aufnahme datum, Diagnose
- » Blutröhrchen für HLA-Typisierung, Virologie und Blutgruppenbestimmung gemäß den jeweiligen aktuellen Standards des TX-Zentrums Graz
- » Anamnese, Aufnahmelabor, aktuelles Labor
- » Medikation (Sedierung, Katecholamine etc.)

Weitere organisatorische Schritte

- » **Abfrage im Widerspruchsregister** sowie Abklärung mit Staatsanwaltschaft bei unnatürlicher Todesursache erfolgt durch TX-Koordinatorinnen/-Koordinatoren des TX-Zentrums
- » aufklärendes **Gespräch mit den Angehörigen**³
- » **Termine** (für Hirntoddiagnostik und Explantation, etc.) sowie **Ansprechpartner** gemeinsam mit TX-Koordinatorinnen/-Koordinatoren vereinbaren
- » Abläufe bei einer **Organentnahme bei Verdacht auf eine gerichtlich strafbare Handlung** lt. akkordierter Verfahrensanweisung⁴

Organisatorischer Ablauf der Hirntoddiagnostik

Organisation der HTD durch TX-Koordinationszentrum Graz

- » Zwei klinische Untersuchungen und EEG durch eine von der Transplantation unabhängige, in der Hirntoddiagnostik erfahrene Ärztin bzw. einen von der Transplantation unabhängigen, in der Hirntoddiagnostik erfahrenen Arzt (lt. Empfehlung des OSR, 2013)⁵

Detaillierte Spenderinformation

- » laut „**Formblatt Spenderdaten**“: wird nach Erstkontakt vom TX-Zentrum gefaxt

1 Siehe „Leitfaden 1 – Kriterien für Organspende“ / „Leitfaden 4 – Intensivtherapie potenzieller Organspender“.

2 Auch „internistische“ Ursachen! Häufigste Ursachen: intracerebrale Blutung, Schädel-Hirn-Trauma, Hirninfarkt. Weitere Ursachen: Hypoxie (z. B. nach Reanimation, Ersticken, etc.).

3 Siehe „Leitfaden 6 – Kommunikation mit den Angehörigen“.

4 Die Verfahrensanweisung „Organentnahme bei Verdacht auf eine gerichtlich strafbare Handlung“ kann von der Website <https://transplant.goeg.at/verfahrensanweisungen> heruntergeladen werden.

5 Siehe „Leitfaden 3 – Hirntoddiagnostik“. Die vollständigen Empfehlungen mit allen Anweisungen und SOP können von der Website <https://transplant.goeg.at/leitfaeden> heruntergeladen werden.